

Thorax longer than broad, viewed from above parallel-sided, the disc with 4 moderate punctures on either side, 3 externally and 2 or 3 behind the anterior angles. Elytra as long as but broader than the thorax, scarcely broader than long, finely and rather closely punctured, finely pubescent. Scutellum black, very finely and densely punctured. Abdomen finely and closely punctured at the bases of the first three segments, much more finely and sparingly elsewhere, especially posteriorly; basal lines not angulate.

♂ unknown.

Habitat: Garo Hills, Assam (Siju Cave).

Type in the Indian Museum, co-type in my collection.

III. ELATERIDAE.

By E. FLEUTIAUX.

Megapenthes vespertilionis, sp. nov.

Long. 8 à 8·5 millim.—Allongé, peu convexe. Dessus noir, pronotum largement jaunâtre sur les côtés et transversalement près de la base; pubescence obscure. Tête brillante, subtricarinée, finement ponctuée; bord antérieur presque droit, peu saillant au milieu; épistome assez large. Yeux normaux, engagés sous le pronotum. Antennes noires, sauf les trois premières articles jaunâtres, atteignant à peu près l'extrémité des angles postérieurs du pronotum: premier article subglobuleux, pas plus long que le 4^e; 2^e et 3^e moins gros, courts, subégaux; suivants plus longs, comprimés et serriformes; dernier anguleusement atténué au sommet. Pronotum brillant, plus long que large, peu rétréci en avant, sinué sur les côtés, convexe, fortement déprimé à la base, sillonné au milieu en arrière sur la partie décline, finement et éparsément ponctué; angles postérieurs aigus, non divergents, unicarénés. Ecusson presque vertical, triangulaire, rugueux. Elytres, légèrement atténués en arrière, ternes, rugueux, ponctués-striés, échancrés au sommet. Dessous noir, propleures jaunes; pubescence jaune clair. Prosternum étroit, parallèle, ponctuation fine et écartée; pointe terminale longue et effilée; sutures simples. Propleures à ponctuation fine, très espacée. Métasternum finement et densément ponctué. Episternes parallèles. Hanches postérieures modérément et anguleusement élargies en dedans, plus larges en dehors que les épisternes. Abdomen finement et densément ponctué. Pattes très grêles, noirâtres avec les articulations jaunâtres; tarses plus minces et plus longs que les tibias.

♀. Long., 10 millim.—Taille plus grande; forme plus parallèle.

Bien conforme à *M. tibialis* Lacordaire. Son pronotum est rougeâtre sur les côtés et en arrière, sauf à l'extrême base; ses élytres sont plus rougoux; ses pattes plus fines; ses antennes plus comprimées et nettement serriformes.

Cette espèce a été recueillie dans une grotte à Siju, dans les collines du Garo (Assam), à 400 pieds de l'entrée, en pleine obscurité, sous une pierre, dans un terrain composé en grande partie de guano de chauve-souris.